

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Material suplementario N° 1. Búsqueda de la evidencia.

Pregunta 1: En pacientes con déficit neurológico focal ¿Cuál es/son la(s) escala(s) más efectivas para establecer la sospecha inicial de ACVi?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

N°	Pregunta PICO (criterios de elegibilidad de los estudios)	Tipo de estudio	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citas identificadas en cada base de datos	Número de citas evaluadas a texto completo/ Número de estudios incluidos
1.1	<p>P: Pacientes con ACV</p> <p>I/C: Escala diagnóstica / Diagnóstico del alta</p> <p>O: Sensibilidad, especificidad, RV+ y RV-, ORD y ABC.</p>	RS de escalas diagnósticas	Enero 2014 a enero 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 579 • CENTRAL: 54 • Citaciones después de excluir duplicados: 631 	4/1
Pregunta PICO planteada para actualizar la búsqueda de la RS Rudd (2016) seleccionada.					
1.1.a	<p>P: Pacientes con ACV</p> <p>I/C: LAPSS, FAST, CPSS y OPSS / Diagnóstico del alta</p> <p>O: Sensibilidad, especificidad, RV+ y RV-, ORD y ABC.</p>	Estudios primarios de test diagnóstico	Enero 2015 a enero 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 380 • CENTRAL: 194 Citaciones después de excluir duplicados: 573 	10/3

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citas evaluadas:

Estrategia de búsqueda para la pregunta Pregunta Clínica N° 1.1:

Base de datos: Medline		
Fecha de búsqueda: Enero del 2018		
Filtros:		
<ul style="list-style-type: none"> • Publication dates: From: 2014/01/01 To: 2018/01/31 		
	Descripción	Término
#1	Población	(((("Neurologic Manifestations" [Mesh] OR (neurologic*[tiab] AND manifestation*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND disease*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND symptom*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND deficit*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND finding*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND sign*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND dysfunction*[tiab]) OR (nervous*[tiab] AND disease*[tiab]) OR (nervous*[tiab] AND disorder*[tiab]) OR (neural*[tiab] AND disease*[tiab]) OR (neurogenic*[tiab] AND disease*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND complaint*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND complaint*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND disturbance*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND syndrome*[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND deficiency*[tiab]))) AND ("Adult"[Mesh] OR adult*[tiab] OR grown*[tiab]))
#2	Intervención	((prehospital*[tiab] AND stroke*[tiab] AND scale*[tiab]) OR "los angeles motor scale"[tiab] OR "lams"[tiab] OR "los angeles prehospital stroke screen"[tiab] OR "lapss"[tiab] OR "Cincinnati"[tiab] "cpss"[tiab] OR "face arm speech test"[tiab] OR "fast"[tiab] OR "recognition of stroke in the emergency room"[tiab] OR "rosier"[tiab] "kurashiki"[tiab] OR "kpss"[tiab] OR "rapid arterial occlusion evaluation"[tiab] OR "race"[tiab] ^[1] OR "medic prehospital assessment"[tiab] OR "med pacs"[tiab]OR "maria"[tiab] OR "mpss"[tiab] OR "national institutes of health stroke scale"[tiab] OR "national institute of health stroke scale"[tiab] OR "national institute of health stroke score"[tiab] OR "national institutes of health stroke score"[tiab] OR "nih stroke scale"[tiab] OR "nih stroke score" OR "nihss"[tiab] OR "emergency triage stroke scale"[tiab] OR "etss"[tiab] OR "birmingham regional emergency medical services system"[tiab] OR "bremss"[tiab] OR "miami emergency neurologic deficit"[tiab] OR "mend"[tiab] OR (frankfurt[tiab] AND stroke[tiab] AND scale[tiab]) OR (neurologic*[tiab] AND disease*[tiab] AND item[tiab] AND stroke[tiab] AND scale[tiab])) OR ("stroke recognition instrument"[TIAB] OR "stroke screening tool"[TIAB]))
#3	Tipo de estudio	(Systematic[<i>sb</i>])
#4	Desenlace	NO

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

#5	Término final	#1 AND #2 AND #3
Base de datos: CENTRAL		
Fecha de búsqueda: : 2014/01/01 To: 2018/01/31		
Filtros:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno 		
	Descripción	Término
#1	Población	((MeSH descriptor: [Neurologic Manifestations] explode all trees OR (neurologic* TI.AB AND manifestation* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND disease* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND symptom* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND deficit* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND finding* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND sign* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND dysfunction* TI.AB) OR (nervous* TI.AB AND disease* TI.AB OR (nervous* TI.AB AND disorder* TI.AB) OR (neural* TI.AB AND disease* TI.AB) OR (neurogenic* TI.AB AND disease* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND complaint* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND disturbance* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND syndrome* TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND deficiency* TI.AB))) AND (MeSH descriptor: [Adult] explode all trees OR adult* TI.AB OR grown* TI.AB))
#2	Intervención	((prehospital* TI.AB AND stroke* TI.AB AND scale* TI.AB) OR los angeles motor scale TI.AB OR lams TI.AB OR los angeles prehospital stroke screen TI.AB OR lapss TI.AB OR Cincinnati TI.AB OR cpss TI.AB OR face arm speech test TI.AB OR fast TI.AB OR recognition of stroke in the emergency room TI.AB OR rosier TI.AB OR kurashiki TI.AB OR kpss TI.AB OR rapid arterial occlusion evaluation TI.AB OR race TI.AB OR medic prehospital assessment TI.AB OR med pacs TI.AB OR maria TI.AB OR mpss TI.AB OR national institutes of health stroke scale TI.AB OR national institute of health stroke scale TI.AB OR national institute of health stroke score TI.AB OR national institutes of health stroke score TI.AB OR nih stroke scale TI.AB OR nih stroke score OR nihss TI.AB OR emergency triage stroke scale TI.AB OR etss TI.AB OR birmingham regional emergency medical services system TI.AB OR bremss TI.AB OR miami emergency neurologic deficit TI.AB OR mend TI.AB OR (Frankfurt TI.AB AND stroke TI.AB AND scale TI.AB) OR (neurologic* TI.AB AND disease* TI.AB AND ítem TI.AB AND stroke TI.AB AND scale TI.AB))) OR (stroke recognition instrument TI.AB OR stroke screening tool TI.AB)
#3	Término final	#1 AND #2

Estrategia de búsqueda para actualización de la pregunta PICO 1.1, actualización de la RS Rudd (2016) seleccionada:

Base de datos: Medline		
Fecha de búsqueda: Enero del 2018		
Filtros:		
<ul style="list-style-type: none"> • Publication dates: From: 2015/01/01 To: 2018/01/31 		
	Descripción	Término
#1	Población	((("stroke"[MeSh] OR stroke*[tiab] _{SEP} OR cerebrovascular accident*[tiab]) AND ((recogni*[tiab] or identi*[tiab] or strati*[tiab]))) AND ("Ambulances"[MeSh] OR Ambulance*[TIAB] OR "Air Ambulances"[MeSh] OR Air Ambulances*[TIAB] OR "Emergency Medical Services"[MeSh] OR Emergency Medical Services*[TIAB] OR "Emergency Medical Technicians"[MeSh] OR Emergency Medical Technicians*[TIAB] OR "Emergency Service, Hospital"[MeSh] OR Emergency Service, Hospital*[TIAB] OR "Transportation of Patients"[MeSh] OR Transportation of Patients*[TIAB] OR "Emergency Medicine"[MeSh] OR Emergency Medicine*[TIAB] OR "Triage"[MeSh] OR Triage*[TIAB]))
#2	Intervención	((("los angeles motor scale"[tiab] OR "lams"[tiab] OR "los angeles prehospital stroke screen"[tiab] _{SEP} OR "lapss"[tiab] OR "Cincinnati"[tiab] "cpss"[tiab] OR "face arm speech test"[tiab] OR "fast"[tiab] OR "recognition of stroke in the emergency room"[tiab] OR "rosier"[tiab] OR "kurashiki"[tiab] OR "kpss"[tiab] _{SEP} OR "rapid arterial occlusion evaluation"[tiab] OR "race"[tiab] OR "medic prehospital assessment"[tiab] _{SEP} OR "med pacs"[tiab] OR "maria"[tiab] OR "mpss"[tiab] OR "Ontario"[tiab] OR "Melbourne"[tiab]) AND (prehospital AND stroke AND screen))
#3	Tipo de estudio	NO
#4	Desenlace	NO
#5	Término final	#1 OR #2
Base de datos: CENTRAL		
Fecha de búsqueda: Enero del 2015 a enero del 2018		
Filtros:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno 		
	Descripción	Término

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngua-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

#1	Población	((MeSH descriptor: [Stroke] explode all trees OR stroke* TI.AB ^[SEP] OR cerebrovascular accident* TI.AB) AND ((recogni* TI.AB or identi* TI.AB or strati* TI.AB))) AND (MeSH descriptor: [Ambulances] explode all trees OR Ambulance* TI.AB OR MeSH descriptor: [Air Ambulances] explode all trees OR Air Ambulances* TI.AB OR MeSH descriptor: [Emergency Medical Services] explode all trees OR Emergency Medical Services* TI.AB OR MeSH descriptor: [Emergency Medical Technicians] explode all trees OR Emergency Medical Technicians* TI.AB OR MeSH descriptor: [Emergency Service, Hospital] explode all trees OR Emergency Service, Hospital* TI.AB OR MeSH descriptor: [Transportation of Patients] explode all trees OR Transportation of Patients* TI.AB OR MeSH descriptor: [Emergency Medicine] explode all trees OR Emergency Medicine* TI.AB OR MeSH descriptor: [Triage] explode all trees OR Triage* TI.AB))
#2	Intervención	((“los angeles motor scale” TI.AB OR “lams” TI.AB OR “los angeles prehospital stroke screen” TI.AB ^[SEP] OR “lapss” TI.AB OR “Cincinnati” TI.AB “cpss” TI.AB OR “face arm speech test” TI.AB OR “fast” TI.AB OR “recognition of stroke in the emergency room” TI.AB OR “rosier” TI.AB OR “kurashiki” TI.AB OR “kpss” TI.AB OR “rapid arterial occlusion evaluation” TI.AB OR “race” TI.AB OR “medic prehospital assessment” TI.AB OR “med pacs” TI.AB OR “maria” TI.AB OR “mpss” TI.AB OR “Ontario” TI.AB OR “Melbourne” TI.AB) AND (prehospital AND stroke AND screen))
#3	Término final	#1 OR #2

Listado de citas evaluadas a texto completo y **excluidas** para la pregunta PICO N° 1.1:

Estudios	Diseño	Razón por la cual se excluyó
Balucani C, Levine SR, Khoury JC, Khatri P, Saver JL, Broderick JP. Acute Ischemic Stroke with Very Early Clinical Improvement : A National Institute of Neurological Disorders and Stroke Recombinant Tissue Plasminogen Activator Stroke Trials Exploratory Analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis [Internet]. 2015;1–8.	Análisis post-hoc de ECA	No se trataba de una RS
Goeggel B, Mono SM, Michel P, Odier C, Sztajzel R, Lyrer P, et al. Risk factors , aetiology and outcome of ischaemic stroke in young adults : the Swiss Young Stroke Study (SYSS). J Neurol. 2015;	EO	No se trataba de una RS
Oostema JA, Carle T, Talia N, Reeves M. Dispatcher Stroke Recognition Using a Stroke Screening Tool: A Systematic Review. Cerebrovasc Dis. 2016;42(5–6):370–7.	RS	Otra población de estudio

Listado de citas evaluadas a texto completo e **incluidas** para la pregunta PICO N° 1:

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Estudios	Diseño
Rudd M, Buck D, Ford GA, Price CI. A systematic review of stroke recognition instruments in hospital and prehospital settings. <i>Emerg Med J</i> . 2016;33(11):818–22.	RS

Listado de citas evaluadas a texto completo y **excluidas** para la pregunta PICO N° 1.1.a:

Estudios	Diseño	Razón por la cual se excluyó
Abboud M, et al. Recognition of Stroke by EMS is Associated with Improvement in Emergency Department Quality Measures. <i>Prehospital Emergency Care</i> . 2016; 20(6): 729 - 736.	EO	No usaba scores diagnósticos
Brandler ES, et al. Prehospital Stroke Identification: Factors Associated with Diagnostic Accuracy. <i>Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases</i> . 2015; 24(9): 2161 – 2166.	EO	No usaba scores diagnósticos
Madsen TE, et al. Potentially Missed Diagnosis of Ischemic Stroke in the Emergency Department in the Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study. <i>Acad Emerg Med</i> . 2016; 23(10): 1128 – 1135.	EO	No usaba scores diagnósticos
Viereck S, et al. Medical dispatchers recognise substantial amount of acute stroke during emergency calls. <i>Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine</i> . 2016; 24(1): 1 – 7.	EO	Diagnóstico realizado por despachados telefónicos
Andsberg G, et al. PreHospital Ambulance Stroke Test - pilot study of a novel stroke test. <i>Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine</i> . 2017; 25(1): 1 – 6.	EO	Uso de otro score diagnóstico
Goyal N, et al. FABS: An Intuitive Tool for Screening of Stroke Mimics in the Emergency Department. <i>Stroke</i> . 2016; 47: 2216 – 2220.	EO	Uso de otro score diagnóstico
McMullan JT, et al. Prospective Prehospital Evaluation of the Cincinnati Stroke Triage Assessment Tool. <i>Prehospital Emergency Care</i> . 2017; 21(4): 481 – 488.	EO	Uso de otro score diagnóstico

Listado de citas evaluadas a texto completo e **incluidas** para la pregunta PICO N° 1.1.a:

Estudios	Diseño
English SW, Rabinstein A, Mandrekar J y Klaas JP. Rethinking Prehospital Stroke Notification: Assessing Utility of Emergency Medical Services Impression and Cincinnati Prehospital Stroke Scale. 2018; 27(4): 919 – 925.	EO
Mao H, et al. Development of a new stroke scale in an emergency setting. <i>BMC Neurology</i> . 2016; 16(1): 1 – 9.	EO
Purrucker JC, et al. Comparison of stroke recognition and stroke severity scores for stroke detection in a single cohort. <i>J Neurol Neurosurg Psychiatry</i> . 2014; 0: 1 – 8.	EO

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngua-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). *Acta Med Peru*. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Pregunta 2: En pacientes con sospecha del diagnóstico de ACVi ¿Cuáles son los estudios de imágenes más útiles para confirmar la presencia de enfermedad en pacientes mayores de 18 años?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 2 preguntas PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Nº	Pregunta PICO (criterios de elegibilidad de los estudios)	Tipo de estudio	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citas identificadas en cada base de datos	Número de citas evaluadas a texto completo/ Número de estudios incluidos
2.1	P: Pacientes con sospecha de ACV I/C: RM/TAC O: Desenlaces priorizados	RS de ECAs o de EO	Noviembre 2013 a noviembre 2017	Búsqueda de RS: <ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 65 • CENTRAL: 15 • Citaciones después de excluir duplicados: 68 Búsqueda de actualización de RS: <ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 365 • CENTRAL: 128 • Citaciones después de excluir duplicados: 366 	3/1
2.2	P: Pacientes con Sospecha de ACV I/C: TAC perfusión/RM O: Desenlaces priorizados	RS de ECAs o de EO	Noviembre 2013 a noviembre 2017	Búsqueda de RS: <ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 76 • CENTRAL: 34 • Citaciones después de excluir duplicados: 82 Búsqueda de actualización de RS:	4/1

				<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 301 • CENTRAL: 117 • Citaciones después de excluir duplicados: 301 	
--	--	--	--	---	--

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citas evaluadas:

Estrategia de búsqueda para la pregunta PICO N° 2.1 y 2.2:

Base de datos: Medline y Central		
Fecha de búsqueda: Desde noviembre 2013 hasta febrero 2018		
	Descripción	Término
#1	Población	“Brain Ischemia”[MESH] or “ischemic stroke”[tiab] or “ischaemic stroke”[tiab] or (brain[tiab] and arterial[tiab] and insufficiency[tiab]) or (brain[tiab] and circulation[tiab] and disorder[tiab]) or (cerebral[tiab] and blood[tiab] and circulation[tiab] and disorder[tiab]) or (cerebral[tiab] and blood[tiab] and flow[tiab] and disorder[tiab]) or (cerebral[tiab] and circulat* and disorder[tiab]) or (cerebr*[tiab] and ischaemi*[tiab]) or (cerebr*[tiab] and ischemi*[tiab]) or (brain[tiab] and ischaemi*[tiab]) OR (cerebrovascular[tiab] and circulation[tiab] and disorder[tiab]) or “ischemic encephalopathy”[tiab] or “neural ischemia”[tiab]
#2	Intervención PICO 2.1	"Magnetic Resonance Imaging"[Mesh] OR "Magnetic Resonance Imaging"[TIAB] OR MR[tiab] OR "magnetic resonance"[tiab] OR NMR[tiab] OR MRI[tiab] OR (magnetic[tiab] and resonance[tiab] and brain[tiab]) OR "Tomography, X-Ray Computed"[Mesh] OR "Computed Tomography"[TIAB] OR (compute*[tiab] AND tomograph*[tiab]) OR (ct[tiab] OR cat[tiab]) OR (cat[tiab] and scan*[tiab] and skull[tiab] or (crani*[tiab] and tomography[tiab]) or (crani*[tiab] and scinti*[tiab]) or (cat[tiab] and scan*[tiab] and crani*[tiab]) or (cat[tiab] and scan*[tiab] and crani*[tiab])
#3	Intervención PICO 2.2	“Perfusion Imaging”[mesh] or (perfusion[tiab] and imaging*[tiab])
#4	Control	-
#5	Outcome	("Sensitivity and Specificity"[Mesh]) OR (sensitivity [TIAB]) OR (specificity [TIAB]) OR (probability [TIAB] AND (“pre test” [TIAB] OR pretest [TIAB] OR “post test” [TIAB] OR posttest [TIAB])) OR (predictive value* [TIAB]) OR (ppv[TIAB]) OR (npv[TIAB]) OR (likelihood ratio* [TIAB]) OR ("Likelihood Functions"[Mesh]) OR (“roc curve” [TIAB]) OR (auc [TIAB]) OR (diagnos* [TIAB] AND (performance* [TIAB] OR accurac* [TIAB] OR utilit* [TIAB] OR

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

		value* [TIAB] OR efficien* [TIAB] OR effectiveness)) OR (gold standard [TIAB])
#6	Término Final PICO 2.1	#1 AND #2 AND #5
#7	Término Final PICO 2.2	#1 AND #3 AND #5
Base de datos: Central		
Fecha de búsqueda: Desde noviembre 2013 hasta febrero 2018		
	Descripción	Término
#1	Población	“Brain Ischemia”:MESH or “ischemic stroke”:ti,ab or “ischaemic stroke”ti,ab or (brain:ti,ab and arterial:ti,ab and insufficiency:ti,ab) or (brain:ti,ab and circulation:ti,ab and disorder:ti,ab) or (cerebral:ti,ab and blood:ti,ab and circulation:ti,ab and disorder:ti,ab) or (cerebral:ti,ab and blood:ti,ab and flow:ti,ab and disorder:ti,ab) or (cerebral:ti,ab and circulat*:ti,ab and disorder:ti,ab) or (cerebr*:ti,ab and ischaemi*:ti,ab) or (cerebr*:ti,ab and ischemi*:ti,ab) or (brain:ti,ab and ischaemi*:ti,ab) OR (cerebrovascular:ti,ab and circulation:ti,ab and disorder:ti,ab) or “ischemic encephalopathy”:ti,ab or “neural ischemia”:ti,ab
#2	Intervención PICO 2.1	"Magnetic Resonance Imaging":Mesh OR "Magnetic Resonance Imaging":TI,AB OR MR:ti,ab OR "magnetic resonance":ti,ab OR NMR:ti,ab OR MRI:ti,ab OR (magnetic:ti,ab and resonance:ti,ab and brain:ti,ab) OR "Tomography, X-Ray Computed":Mesh OR "Computed Tomography":TI,AB OR (compute*:ti,ab AND tomograph*:ti,ab) OR (ct:ti,ab OR cat:ti,ab) OR (cat:ti,ab and scan*:ti,ab and skull:ti,ab or (crani*:ti,ab and tomography:ti,ab) or (crani*:ti,ab and scinti*:ti,ab) or (cat:ti,ab and scan*:ti,ab and crani*:ti,ab) or (cat:ti,ab and scan*:ti,ab and crani*:ti,ab)
#3	Intervención PICO 2.2	“Perfusion Imaging”:mesh or (perfusion:ti,ab and imaging*:ti,ab)
#4	Control	-
#5	Outcome	Sensitivity:ti,ab or Specificity:ti,ab
#6	Termino Final PICO 2.1	#1 AND #2 AND #5
#7	Termino Final PICO 2.2	#1 AND #3 AND #5

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Lista de Excluidos:

Excluidos PICO 2.1	Motivo
Mair et al. 2015	Evalúa la sensibilidad y especificidad de un signo específico en TAC o RM, el signo de la arteria hiperdensa.
Kang et al. 2017	Evalúa la sensibilidad y especificidad del signo del vaso hiperdenso en TAC o RM para predecir el tipo de ACV.
Excluidos PICO 2.2	Motivo
Li et al 2017	Evalúa predicción de volumen del infarto por medio de modelos matemáticos
Mokin et al 2017	No brinda información de precisión diagnóstica
Wouters et al 2016	No brinda información de precisión diagnóstica

Pregunta 3: En pacientes con ACVi ¿Cuál son las escalas más útiles para evaluar la severidad del ataque cerebrovascular isquémico?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Nº	Pregunta PICO (criterios de elegibilidad de los estudios)	Tipo de estudio	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citas identificadas en cada base de datos	Número de citas evaluadas a texto completo/ Número de estudios incluidos
3.1	<p>P: Pacientes con ACV</p> <p>I/C: Escala diagnóstica / Diagnóstico clínico de ECV</p> <p>O: Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN</p>	RS y EP de escalas diagnósticas	Enero 2014 a enero 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE RS: 56 • MEDLINE EP: 196 • Citaciones después de excluir duplicados: 77 	7/2

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citas evaluadas:

Estrategia de búsqueda para la Pregunta Clínica N° 3.1:

Base de datos: Medline
Fecha de búsqueda: Febrero del 2018
Filtros: <ul style="list-style-type: none"> • Publication dates: From: 2014/01/01 To: 2018/02/17

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngua-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

	Descripción	Término
#1	Población	((((((((((((Brain Ischemia[MeSH Terms]) OR ((ischemic*[tiab] AND stroke*[tiab]))) OR ((brain*[tiab] AND arterial*[tiab] AND insufficiency*[tiab]))) OR ((cerebral*[tiab] AND blood*[tiab] AND circulation*[tiab] AND disorder*[tiab]))) OR (neural ischemia*[tiab])) OR ((neurologic*[tiab] AND disturbance*[tiab])) OR ((neurologic*[tiab] AND syndrome*[tiab])) OR ((neurologic*[tiab] AND deficit*[tiab])) OR ((neurologic*[tiab] AND finding*[tiab])) OR ((neurologic*[tiab] AND sign*[tiab])) OR ((neurologic*[tiab] AND deficiency*[tiab])) OR Neurologic Manifestations [Mesh])) AND (((Adult [Mesh]) OR adult*[tiab]) OR grown*[tiab]))
#2	Intervención	((((((((((("national institutes of health stroke scale"[tiab]) OR "national institute of health stroke scale"[tiab]) OR "national institutes of health stroke score"[tiab]) OR "national institute of health stroke score"[tiab]) OR "nih stroke scale"[tiab]) OR "nih stroke score"[tiab]) OR "nihss"[tiab]) OR "canadian neurological scale"[tiab]) OR "cns"[tiab]) OR (("copenhagen"[tiab] AND "scale"[tiab])) OR (("scandinavian"[tiab] AND "stroke"[tiab] AND "scale"[tiab])) OR "scandinavian neurological stroke scale"[tiab]) OR "unified neurological stroke scale"[tiab]
#3	Tipo de estudio	(Systematic[sb]), Clinical study[sb]
#4	Desenlace	NO
#5	Término final	#1 AND #2 AND #3

Listado de citas evaluadas a texto completo y **excluidas** para la pregunta PICO N° 3.1:

Estudios	Diseño	Razón por la cual se excluyó
Scheitz JF, Abdul-Rahim AH, MacIsaac RL, Cooray C, Sucharew H, Kleindorfer D, et al. Clinical selection strategies to identify ischemic stroke patients with large anterior vessel occlusion. <i>Results From SITS-ISTR (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke International Stroke Thrombolysis Registry)</i> . 2017;48:290-297	Cohorte	Limitado a vaso grande
Turc G, Maier B, Naggara O, Seners P, Isabel C, Tisserand M, et al. Clinical scales do not reliably identify acute ischemic stroke patients with large-artery occlusion. <i>Stroke</i> . 2016;47:1466-1472	Cohorte	Limitado a vaso grande
Heldner MR, Hsieh K, Broeg-Morvay A, Mordasini P, Bühlmann M, Jung S, et al. Clinical prediction of large	Cohorte	Limitado a vaso grande

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). *Acta Med Peru*. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

vessel occlusion in anterior circulation stroke: Mission impossible? <i>Journal of neurology</i> . 2016;263:1633-1640		
De Raedt S, Brouns R, De Smedt A, Aries M, Uyttenboogaart M, Luijckx G, et al. The snihss-4 predicts outcome in right and left anterior circulation strokes. <i>Clinical neurology and neurosurgery</i> . 2013;115:729-731	Cohorte	Solo diferencias en topografía de la circulación, excede la antigüedad
Sato S, Toyoda K, Uehara T, Toratani N, Yokota C, Moriwaki H, et al. Baseline nih stroke scale score predicting outcome in anterior and posterior circulation strokes. <i>Neurology</i> . 2008;70:2371-2377	Cohorte	Diferencias en tipo de circulación, excede la antigüedad

Listado de citas evaluadas a texto completo e **incluidas** para la pregunta PICO N° 1:

Estudios	Diseño
Cooray C, Fekete K, Mikulik R, Lees KR, Wahlgren N, Ahmed N. Threshold for nih stroke scale in predicting vessel occlusion and functional outcome after stroke thrombolysis. <i>International Journal of Stroke</i> . 2015;10:822-829	Cohorte
Mansour OY, Megahed MM, Elghany E. Acute ischemic stroke prognostication, comparison between glasgow coma score, nihs scale and full outline of unresponsiveness score in intensive care unit. <i>Alexandria Journal of Medicine</i> . 2015;51:247-253	Cohorte

Pregunta 4: En pacientes con ACVi ¿cuál es la terapia de reperfusión arterial más efectiva y segura?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo preguntas PICO, cuyas características se resumen a continuación:

N°	Pregunta PICO (criterios de elegibilidad de los estudios)	Tipo de estudio	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citas identificadas en cada base de datos	Número de citas evaluadas a texto completo/ Número de estudios incluidos
4.1	P: Pacientes con ACV isquémico	RS de ECAs	enero 2013 a	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 316 • CENTRAL: 178 	4/1

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaranga-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). *Acta Med Peru*. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

	I/C: Trombólisis endovenosa O: Desenlaces priorizados		enero 2018	• Citaciones después de excluir duplicados: 374	
4.2	P: Pacientes con ACV isquémico de vaso grande I/C: Trombectomía mecánica O: Desenlaces priorizados	RS de ECAs	enero 2013 a enero 2018	• MEDLINE: 177 • CENTRAL: 427 • Citaciones después de excluir duplicados: 477	3/3

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Estrategia de búsqueda para la pregunta PICO N° 5:

Base de datos: Medline		
Fecha de búsqueda: febrero 2013 hasta febrero 2018		
	Descripción	Término
#1	Población	“Brain Ischemia”[MESH] or “ischemic stroke”[tiab] or “ischaemic stroke”[tiab] or (brain[tiab] and arterial[tiab] and insufficiency[tiab]) or (brain[tiab] and circulation[tiab] and disorder[tiab]) or (cerebral[tiab] and blood[tiab] and circulation[tiab] and disorder[tiab]) or (cerebral[tiab] and blood[tiab] and flow[tiab] and disorder[tiab]) or (cerebral[tiab] and circulat* and disorder[tiab]) or (cerebr*[tiab] and ischaemi*[tiab]) or (cerebr*[tiab] and ischemi*[tiab]) or (brain[tiab] and ischaemi*[tiab]) OR (cerebrovascular[tiab] and circulation[tiab] and disorder[tiab]) or “ischemic encephalopathy”[tiab] or “neural ischemia”[tiab]
#2	Intervención PICO 4.1	“IV Thrombolysis”[TIAB] OR Clot Disruption*[TIAB] or atepulse[tiab]
#3	Intervención PICO 4.2	Thrombectomy[MESH] OR Thrombectom*[TIAB] OR Percutaneous Aspiration Thrombectom*[TIAB] OR Aspiration Thrombectom*[TIAB] OR Mechanical Thrombolysis*[TIAB] OR Mechanical Clot Disruption*[TIAB]
#4	Control	-

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngua-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

#5	Outcome	("Mortality"[Mesh] OR "Survival Rate"[Mesh] OR "Survival Analysis"[Mesh] OR Mortality[tiab] OR Death[tiab] OR Deaths[tiab] OR Survival[tiab]) AND (Disability[tiab] OR rankin[tiab])
#6	Termino Final PICO 4.1	#1 AND #2 AND #5
#7	Termino Final PICO 4.2	#1 AND #3 AND #5
Base de datos: Central		
Fecha de búsqueda: Desde noviembre 2013 hasta febrero 2018		
	Descripción	Término
#1	Población	“Brain Ischemia”:MESH or “ischemic stroke”:ti,ab or “ischaemic stroke”ti,ab or (brain:ti,ab and arterial:ti,ab and insufficiency:ti,ab) or (brain:ti,ab and circulation:ti,ab and disorder:ti,ab) or (cerebral:ti,ab and blood:ti,ab and circulation:ti,ab and disorder:ti,ab) or (cerebral:ti,ab and blood:ti,ab and flow:ti,ab and disorder:ti,ab) or (cerebral:ti,ab and circulat*:ti,ab and disorder:ti,ab) or (cerebr*:ti,ab and ischaemi*:ti,ab) or (cerebr*:ti,ab and ischemi*:ti,ab) or (brain:ti,ab and ischaemi*:ti,ab) OR (cerebrovascular:ti,ab and circulation:ti,ab and disorder:ti,ab) or “ischemic encephalopathy”:ti,ab or “neural ischemia”:ti,ab
#2	Intervención PICO 4.1	Thrombolysis:ti,ab or atepase:ti,ab
#3	Intervención PICO 4.2	Thrombectom*:ti,ab or Percutaneous Aspiration Thrombectom*:ti,ab or Aspiration Thrombectom*:ti,ab or Mechanical Thrombolysis*:ti,ab or Mechanical Clot Disruption*:ti,ab
#4	Control	-
#5	Outcome	Mortality:ti,ab OR Disability:ti,ab OR rankin:ti,ab
#6	Termino Final PICO 4.1	#1 AND #2 AND #5
#7	Termino Final PICO 4.2	#1 AND #3 AND #5

Lista de Incluidos:

Lista de Excluidos:

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Excluidos PICO 4.1	Motivo
Emberson et al 2014	Evalúa la eficacia de trombólisis según tiempos
Nam et al. 2015	Evalúa trombólisis intraarterial versus endovenosa
Cheng et al. 2018	Evalúa dosis bajas de rTPA versus dosis estándares
Excluidos PICO 4.2	Motivo
Gerg et al 2017	Revisión narrativa de eficacia de trombectomía mecánica

Pregunta 5: En pacientes con ACVi ¿Cuáles son los tratamientos diferentes a la reperfusión (prevención secundaria) más efectivos y seguros?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 9 preguntas PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Nº	Pregunta PICO (criterios de elegibilidad de los estudios)	Tipo de estudio	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citas identificadas en cada base de datos	Número de citas evaluadas a texto completo/ Número de estudios incluidos
5.1	P: Pacientes con ACV I/C: Monitoreo continuo / intermitente O: Desenlaces priorizados	RS de ECA	Enero 2014 a diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 148 • CENTRAL: 46 • Citaciones después de excluir duplicados: 0 	0/0
5.2	P: Pacientes con ACV I/C: Modificar la PA deliberadamente / no modificarla	RS de ECA	Enero 2014 a diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 148 • CENTRAL: 46 • Citaciones después de excluir duplicados: 0 	1/1

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barrios K, Huaranga-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

	O: Desenlaces prioritizados				
5.3	P: Pacientes con ACV I/C: Control glicémico estricto con insulina para mantener niveles de 72 a 135 mg/dL / no intervenir O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> •MEDLINE: 148 •CENTRAL: 46 •Citaciones después de excluir duplicados: 0 	0/0
5.4	P: Pacientes con ACV I/C: Hipotermia terapéutica / normotermia O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> •MEDLINE: 148 •CENTRAL: 46 •Citaciones después de excluir duplicados: 0 	0/0
5.5	P: Pacientes con ACV I/C: Antiagregantes / Placebo O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> •MEDLINE: 148 •CENTRAL: 46 •Citaciones después de excluir duplicados: 0 	0/0
5.6	P: Pacientes con ACV I/C: Anti agregación doble / Anti agregación simple O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> •MEDLINE: 148 •CENTRAL: 46 •Citaciones después de excluir duplicados: 0 	3/1
5.7.1	P: Pacientes con ACV I/Anticoagulación / Placebo O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> •MEDLINE: 148 •CENTRAL: 46 •Citaciones después de excluir duplicados: 0 	1/1
5.7.2	P: Pacientes con ACV I/C: Anticoagulación / antiagregantes O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> •MEDLINE: 148 •CENTRAL: 46 •Citaciones después de excluir duplicados: 0 	0/0
5.8	P: Pacientes con ACV	RS de ECA y	Enero 2014 a	<ul style="list-style-type: none"> •MEDLINE: 148 •CENTRAL: 46 	1/1

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

	I/C: Estatinas / Placebo O: Desenlaces priorizados	observaciones	diciembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Citaciones después de excluir duplicados: 0 	
--	---	---------------	----------------	---	--

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Estrategia de búsqueda para la pregunta **Pregunta 5:**

Base de datos: Medline		
Fecha de búsqueda: de enero 2014 a diciembre 2017		
Filtros: <ul style="list-style-type: none"> • Publication dates: de enero 2014 a diciembre 2017 • RS 		
	Descripción	Término
#1	Población	((Brain Ischemia[MeSH] OR “ischemic stroke”[tiab] OR “ischaemic stroke”[tiab] OR (brain[tiab] AND arterial[tiab] AND insufficiency[tiab]) OR (brain[tiab] AND circulatio*[tiab] AND disorder[tiab]) OR (cerebr*[tiab] AND blood[tiab] AND circulation[tiab] AND disorder[tiab]) OR (cerebr*[tiab] AND blood[tiab] AND flow AND disorder[tiab]) OR (cerebr*[tiab] AND circulat*[tiab] AND disorder[tiab]) OR (cerebr*[tiab] AND ischaemi*[tiab]) OR (cerebr*[tiab] AND ischemi*[tiab]) OR (brain[tiab] AND ischaemi*[tiab]) OR (brain[tiab] AND ischemi*[tiab]) OR (cerebrovascular[tiab] AND circulation[tiab] AND disorder[tiab]) OR “ischemic encephalopathy”[tiab] OR “neural ischemia”[tiab]) AND (Adult[MESH] OR Adult*[tiab] OR Grown*[tiab]))
#2	Intervención	((inhibitor*[tiab] AND platelet[tiab]) OR (antiplatelet[tiab] AND agent*[tiab]) OR (antiplatelet[tiab] AND drug*[tiab]) OR Aspirin[MeSH] OR Aspirin[tiab] OR “acetylsalicylic acid”[tiab] OR clopidogrel[tiab] OR Dipyridamole[MeSH] OR dipyridamole[tiab] OR tirofiban[tiab] OR eptifibatide[tiab] OR cilostazol[tiab] OR triflusal[tiab] OR ticagrelor[tiab] OR vorapaxar[tiab] OR prasugrel[tiab] OR Anticoagulants[MeSH] OR anticoagulant*[tiab] OR Heparin[MeSH] OR Heparin, Low-Molecular-Weight[MeSH] OR heparin[tiab] OR lmwh[tiab] OR (thrombin[tiab] AND inhibitor*[tiab]) OR Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors[MeSH] OR statin*[tiab] OR atorvastatin[tiab] OR Simvastatin[MeSH] OR simvastatin[tiab] OR “glycemic control”[tiab] OR “blood pressure regulation”[tiab] OR “blood pressure control”[tiab] OR Body Temperature Regulation[MeSH] OR thermoregulation[tiab] OR (temperatura[tiab] AND regulation[tiab]) OR (temperatura[tiab] AND manag*[tiab]) OR Antipyretics[MeSH] OR antipyretic*[tiab]

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

		OR Acetaminophen[MeSH] OR acetaminophen[tiab] OR paracetamol[tiab] OR Ibuprofen[MeSH] OR Ibuprofen[tiab] OR “heart monitoring”[tiab] OR (cardiac[tiab] AND monitoring[tiab]) OR (head[tiab] AND position*[tiab]) OR (early[tiab] AND onset[tiab] AND oral[tiab] AND route[tiab])
#3	Desenlace	<ul style="list-style-type: none"> • Mortalidad • Discapacidad según escala modificada de Rankin • Efectos adversos
#4	Término final	#1 AND #2
Base de datos: CENTRAL		
Fecha de búsqueda: de enero 2014 a diciembre 2017		
Filtros:		
<ul style="list-style-type: none"> • RS 		
	Descripción	Término
#1	Población	((MeSH descriptor: [Brain Ischemia] explode all trees OR 'ischemic stroke':ti,ab OR 'ischaemic stroke':ti,ab OR (brain near/5 arterial near/5 insufficiency):ti,ab OR (brain near/5 circulation near/5 disorder):ti,ab OR (cerebral near/5 blood near/5 circulation near/5 disorder):ti,ab OR (cerebral near/5 blood near/5 flow near/5 disorder):ti,ab OR (cerebral near/5 circulat* near/5 disorder):ti,ab OR (cerebr*near/5 ischaemi*):ti,ab OR (cerebr* near/5 ischemi*):ti,ab OR (brain near/5 ischaemi*):ti,ab OR (brain near/5 ischemi*):ti,ab OR (cerebrovascular adj5 circulation near/5 disorder):ti,ab OR 'ischemic encephalopathy':ti,ab OR 'ischemic encephalopathy':ti,ab) AND (MeSH descriptor: [Adult] explode all trees OR adult*:ti,ab OR grown*:ti,ab))
#2	Intervención	(MeSH descriptor: [Aspirin] explode all trees OR (aspirin):ti,ab OR 'acetylsalicylic acid':ti,ab OR clopidogrel:ti,ab OR MeSH descriptor: [Dipyridamole] explode all trees OR dipyridamole:ti,ab OR tirofiban:ti,ab OR eptifibatide:ti,ab OR cilostazol:ti,ab OR triflusal:ti,ab OR ticagrelor:ti,ab OR vorapaxar:ti,ab OR prasugrel:ti,ab OR MeSH descriptor: [Anticoagulants] explode all trees OR anticoagulant*:ti,ab OR MeSH descriptor: [Heparin] explode all trees OR MeSH descriptor: [Heparin, Low-Molecular-Weight] explode all trees OR heparin:ti,ab OR lmwh:ti,ab OR (thrombin near/5 inhibitor*):ti,ab OR MeSH descriptor: [Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors] explode all trees OR statin*:ti,ab OR atorvastatin:ti,ab OR MeSH descriptor: [Simvastatin] explode all trees OR simvastatin:ti,ab OR MeSH descriptor: [Oxygen Inhalation Therapy] explode all trees OR (oxygen near/5 supply):ti,ab OR (o2 near/5 supply):ti,ab OR (oxygen near/5 therapy):ti,ab OR (o2 near/5 therapy):ti,ab OR (o2 near/5 administration):ti,ab OR (oxygen near/5 administration):ti,ab OR 'glycemic control':ti,ab OR 'blood pressure regulation':ti,ab OR

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngua-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

		'blood pressure control':ti,ab OR (thrombosis near/5 prevention):ti,ab OR (prophylaxis near/5 thrombosis):ti,ab OR (antithrombotic near/5 prophylaxis):ti,ab OR MeSH descriptor: [Body Temperature Regulation] explode all trees OR thermoregulation:ti,ab OR (temperature near/5 regulation):ti,ab OR (temperature near/5 manag*):ti,ab OR MeSH descriptor: [Patient Positioning] explode all trees OR (patient near/5 position*):ti,ab OR (intravenous near/5 fluid*):ti,ab OR (iv near/5 fluid*):ti,ab OR (volemia near/5 manag*):ti,ab OR (volemia near/5 control):ti,ab OR (blood near/5 volume near/5 manag*):ti,ab OR (blood near/5 volume near/5 control):ti,ab OR MeSH descriptor:[Vasodilation] explode all trees OR vasodilation:ti,ab OR vasodilatation:ti,ab OR MeSH descriptor: [Serum Albumin] explode all trees OR albumin:ti,ab OR MeSH descriptor: [Interactive Ventilatory Support] explode all trees OR (ventilat* near/5 support):ti,ab OR (ventilat* near/5 assist*):ti,ab OR MeSH descriptor: [Antipyretics] explode all trees OR antipyretic*:ti,ab OR MeSH descriptor: [Acetaminophen] explode all trees OR acetaminophen:ti,ab OR paracetamol:ti,ab OR MeSH descriptor: [Ibuprofen] explode all trees OR ibuprofen:ti,ab OR 'heart monitoring':ti,ab OR (cardiac near/5 monitoring):ti,ab OR (head near/5 position*):ti,ab OR (early near/5 onset near/5 oral near/5 route):ti,ab)
#3	Término final	#1 AND #2

Listado de citas evaluadas a texto completo y **excluidas** para la pregunta 5:

Estudios	Diseño	Pregunta PICO N°	Razón por la cual se excluyó
Lee M, Saver JL, Hong K-S, Rao NM, Wu Y-L, Ovbiagele B. Risk–Benefit Profile of Long-Term Dual- Versus Single-Antiplatelet Therapy Among Patients With Ischemic Stroke. <i>Ann Intern Med.</i> 2013 Oct 1 ;159(7):463.	RS	5.6	Posee desenlaces no significativos
Zhang Q, Wang C, Zheng M, Li Y, Li J, Zhang L, et al. Aspirin plus Clopidogrel as Secondary Prevention after Stroke or Transient Ischemic Attack: A Systematic Review and Meta-Analysis. <i>Cerebrovasc Dis.</i> 2015;39(1):13–22.	RS	5.6	Posee desenlaces no significativos

Listado de citas evaluadas a texto completo e **incluidas** para la pregunta 5:

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). *Acta Med Peru.* 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Estudios	Pregunta PICO N°	Diseño
Bath PM, Krishnan K. Interventions for deliberately altering blood pressure in acute stroke. The Cochrane database of systematic reviews. 2014(10):Cd000039.	5.2	RS
Liu Y, Fei Z, Wang W, Fang J, Zou M, Cheng G. Efficacy and safety of short-term dual- versus mono-antiplatelet therapy in patients with ischemic stroke or TIA: a meta-analysis of 10 randomized controlled trials. J Neurol. 2016 Nov 19;263(11):2247–59.	5.6	RS
Sandercock PA, Counsell C, Kane EJ. Anticoagulants for acute ischaemic stroke. The Cochrane database of systematic reviews. 2015(3):Cd000024.	5.7	RS
Ni Chroinin D, Asplund K, Asberg S, Callaly E, Cuadrado-Godia E, Diez-Tejedor E, et al. Statin Therapy and Outcome After Ischemic Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies and Randomized Trials. Stroke. 2013 Feb 1;44(2):448–56.	5.9	RS

Pregunta 6: En pacientes con ACVi ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas y seguras para la neuro protección del paciente con ECV agudo?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 5 preguntas PICO, cuyas características se resumen a continuación:

N°	Pregunta PICO (criterios de elegibilidad de los estudios)	Tipo de estudio	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citas identificadas en cada base de datos	Número de citas evaluadas a texto completo/ Número de estudios incluidos
6.1	P: Pacientes con ACV	RS de ECA	Enero 2014 a	<ul style="list-style-type: none"> ● MEDLINE: 290 ● CENTRAL: 88 	3/1

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

	I/C: citicolina / no uso O: Desenlaces prioritizados		marzo 2018	• Citaciones después de excluir duplicados: 310	
6.2	P: Pacientes con ACV I/C: sulfato de magnesio / no uso O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	• MEDLINE: 290 • CENTRAL: 88 • Citaciones después de excluir duplicados: 310	1/1
6.3	P: Pacientes con ACV I/C: manitol / no uso O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	• MEDLINE: 290 • CENTRAL: 88 • Citaciones después de excluir duplicados: 310	1/1
6.4	P: Pacientes con ACV I/C: hemodilución / no uso O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	• MEDLINE: 290 • CENTRAL: 88 • Citaciones después de excluir duplicados: 310	1/1
6.5	P: Pacientes con ACV I/C: células madre / no uso O: Desenlaces prioritizados	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	• MEDLINE: 290 • CENTRAL: 88 • Citaciones después de excluir duplicados: 310	1/1

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citas evaluadas:

Estrategia de búsqueda para la pregunta **Pregunta 6:**

Base de datos: Medline		
Fecha de búsqueda: marzo 2018		
Filtros:		
<ul style="list-style-type: none"> • Publication dates: From: 2000/01/01 • RS 		
	Descripción	Término
#1	Población	Search (((((((stroke[MeSH Terms]) OR acute strokes[MeSH Terms]) OR acute stroke[MeSH Terms]) OR Brain ischemia[MeSH Major Topic])) NOT (((((((rodent[MeSH Terms]) OR animal model[MeSH

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

		Terms)) OR animal models[MeSH Terms]) OR animal model[Title/Abstract]) OR animal models[Title/Abstract]) OR neonatal[Title/Abstract]) OR newborn[Title/Abstract]) OR infant[Title/Abstract]))))
#2	Intervención	((((((((((((((neuroprotection[Title/Abstract]) OR (recovery[Title/Abstract]) OR mannitol[Title/Abstract]) OR citicoline[Title/Abstract]) OR magnesium[Title/Abstract]) OR URIC[Title/Abstract]) OR nimodipine[Title/Abstract]) OR albumin[Title/Abstract]) OR hypervolemia[Title/Abstract]) OR sertraline[Title/Abstract]) OR Cerebrolysin[Title/Abstract]) OR fingolimod[Title/Abstract]) OR immune modulator[Title/Abstract]) OR minocycline[Title/Abstract]) OR natalizumab[Title/Abstract]) OR uric acid[Title/Abstract]))))
#3	Tipo de estudio	((systematic review[Publication Type]) OR (meta-analysis[Publication Type]))
#4	Desenlace	<ul style="list-style-type: none"> • Mortalidad • Discapacidad según escala modificada de Rankin • Efectos adversos
#5	Término final	#1 AND #2 AND #3
Base de datos: CENTRAL		
Fecha de búsqueda: marzo 2018		
Filtros:		
<ul style="list-style-type: none"> • RS 		
	Descripción	Término
#1	Población	Search (((((((stroke[MeSH Terms]) OR acute strokes[MeSH Terms]) OR acute stroke[MeSH Terms]) OR Brain ischemia[MeSH Major Topic])) AND ((adult[MeSH Terms]) OR adult[Title/Abstract])) NOT (('pregnant':ti,ab OR 'pregnancy':ti,ab OR 'rodent':ti,ab))
#2	Intervención	((((((((((((((neuroprotection[Title/Abstract]) OR (recovery[title/abstract]) OR mannitol[Title/Abstract]) OR citicoline[Title/Abstract]) OR magnesium[Title/Abstract]) OR URIC[Title/Abstract]) OR nimodipine[Title/Abstract]) OR albumin[Title/Abstract]) OR hypervolemia[Title/Abstract]) OR sertraline[Title/Abstract]) OR Cerebrolysin[Title/Abstract]) OR fingolimod[Title/Abstract]) OR immune modulator[Title/Abstract]) OR minocycline[Title/Abstract]) OR natalizumab[Title/Abstract]) OR uric acid[Title/Abstract]))))

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

#3	Término final	#1 AND #2
----	---------------	-----------

Listado de citas evaluadas a texto completo y **excluidas** para la pregunta 6:

Estudios	Diseño	Razón por la cual se excluyó
Dávalos A, Castillo J, Álvarez-Sabín J, Secades JJ, Mercadal J, López S, et al. Oral citicolina in acute ischemic stroke: An individual patient data pooling analysis of clinical trials. <i>Stroke</i> . 2002;33:2850-2857	RS	Contenido en el estudio elegido
Secades JJ, Alvarez-Sabín J, Castillo J, Díez-Tejedor E, Martínez-Vila E, Ríos J, et al. Citicolina for acute ischemic stroke: A systematic review and formal meta-analysis of randomized, double-blind, and placebo-controlled trials. <i>Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases</i> . 2016;25:1984-1996	RS	Alto riesgo de sesgo

Listado de citas evaluadas a texto completo e **incluidas** para la pregunta 6:

Estudios	Diseño	
Shi P-y, Zhou X-c, Yin X-x, Xu L-l, Zhang X-m, Bai H-y. Early application of citicolina in the treatment of acute stroke: A meta-analysis of randomized controlled trials. <i>Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences]</i> . 2016;36:270-277	RS	Citicolina
Saver JL, Starkman S, Eckstein M, Stratton SJ, Pratt FD, Hamilton S, et al. Prehospital use of magnesium sulfate as neuroprotection in acute stroke. <i>New England Journal of Medicine</i> . 2015;372:528-536	ECA	Sulfato de magnesio
Berezki D, Fekete I, Prado GF, Liu M. Mannitol for acute stroke. <i>The Cochrane database of systematic reviews</i> . 2007: Cd001153	RS	Manitol
Chang TS, Jensen MB. Haemodilution for acute ischaemic stroke. <i>The Cochrane database of systematic reviews</i> . 2014: Cd000103	RS	Hemodilución
Wang Q, Duan F, Wang MX, Wang XD, Liu P, Ma LZ. Effect of stem cell-based therapy for ischemic stroke treatment: A meta-analysis. <i>Clinical neurology and neurosurgery</i> . 2016;146:1-11	RS	Células madre

Pregunta 7: En pacientes con ACVi extenso o maligno ¿es eficaz y seguro la intervención quirúrgica (craneotomía o hemicraniectomía) frente al tratamiento estándar?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 1 preguntas PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Nº	Pregunta PICO (criterios de elegibilidad de los estudios)	Tipo de estudio	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citas identificadas en cada base de datos	Número de citas evaluadas a texto completo/ Número de estudios incluidos
7.1	<p>P: Pacientes con ACV con infarto extenso o maligno complicado con edema cerebral</p> <p>I/C: Cirugía descompresiva/ Tratamiento médico o placebo</p> <p>O: Mortalidad, discapacidad, calidad de vida, eventos adversos</p>	RS de ECA o de estudios observacionales	Búsqueda realizada desde el 1 mayo del 2008 hasta mayo del 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 319 • CENTRAL: 194 • Citaciones después de excluir duplicados: 373 	17/1

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citas evaluadas:

Estrategia de búsqueda para la pregunta clínica 7:

Base de datos: Medline		
Fecha de búsqueda: hasta mayo 2018		
Filtros: Fecha de publicación desde:2008, Revisiones sistemáticas y Meta-análisis		
	Descripción	Término
1	Población	“cerebrovascular disorders”[MeSH] OR “stroke”[MeSH]) OR (stroke*[tw] OR cerebral vascular[tw] OR cerebrovasc*[tw] OR cva[tw]) OR ((brain[tw] OR cerebr*[tw] OR hemisph*[tw] OR intracranial[tw] OR mca[tw] OR anterior circulat*[tw]) AND (ischemi*[tw] OR infarct*[tw] OR emboli*[tw] OR thrombo*[tw] OR occlus*[tw] OR hypoxi*[tw] OR apople*[tw])

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

2	Intervención	“decompression, surgical”[MeSH] OR “neurosurgical procedures”[MeSH] OR “craniotomy”[MeSH] OR “trephining”[MeSH]) OR (decompress*[tw] OR craniectom*[tw] OR craniotom*[tw] OR hemicraniect*[tw] OR trepa*[tw] OR treph*[tw]) OR (hippocampectom*[tw] OR lobectom*[tw] OR strokectom*[tw])
3	Comparador	Se seleccionó manualmente
4	Tipo de estudio	Revisión sistemática o Meta-análisis
5	Desenlace	Mortalidad, discapacidad, calidad de vida, eventos adversos
	Término final	#1 AND #2

Base de datos: The Cochrane Library (CENTRAL)		
Fecha de búsqueda: hasta mayo 2018		
Filtros: Fecha de publicación desde: selección manual de los últimos 10 años; Revisiones sistemáticas y Meta-análisis		
	Descripción	Término
1	Población	“cerebrovascular disorders”/ OR “stroke”/) OR (stroke*TI.AB OR cerebral vascularTI.AB OR cerebrovasc*TI.AB OR cvaTI.AB) OR ((brainTI.AB OR cerebr*TI.AB OR hemisph*TI.AB OR intracranialTI.AB OR mcaTI.AB OR anterior circulat*TI.AB) AND (ischemi*TI.AB OR infarct*TI.AB OR emboli*TI.AB OR thrombo*TI.AB OR oclus*TI.AB OR hypoxi*TI.AB OR apople*TI.AB
2	Intervención	“decompression, surgical”/ OR “neurosurgical procedures”/ OR “craniotomy”/ OR “trephining”/) OR (decompress*TI.AB OR craniectom*TI.AB OR craniotom*TI.AB OR hemicraniect*TI.AB OR trepa*TI.AB OR treph*TI.AB) OR (hippocampectom*TI.AB OR lobectom*TI.AB OR strokectom*TI.AB
3	Comparador	Se seleccionó manualmente
4	Tipo de estudio	Revisión sistemática o Meta-análisis
5	Desenlace	Mortalidad, discapacidad, calidad de vida, eventos adversos
	Término final	#1 AND #2

Listado de citas evaluadas a texto completo y **excluidas** para la pregunta PICO N° 8:

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Estudios	Diseño	Razón por la cual se excluyó
Back L, Nagaraja V, Kapur A, Eslick GD. Role of decompressive hemicraniectomy in extensive middle cerebral artery strokes: a meta-analysis of randomised trials. <i>Intern Med J.</i> 2015 Jul; 45(7):711–7 (1)	RS	Baja calidad post evaluación AMSTAR II
Green TL, Newcommon N, Demchuk A. Quality of life and caregiver outcomes following decompressive hemicraniectomy for severe stroke: a narrative literature review. <i>Can J Neurosci Nurs.</i> 2010;32(2):24–33 (2)	RS	No posee desenlaces de interés
Güresir E, Schuss P, Seifert V, Vatter H. Decompressive Craniectomy in Children. <i>Neurosurgery.</i> 2012 Apr;70(4):881–9 (3)	RS	La población fue pediátrica
Hofmeijer J, Kappelle LJ, Algra A, Amelink GJ, van Gijn J, van der Worp HB, et al. Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction (the Hemicraniectomy After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening Edema Trial [HAMLET]): a multicentre, open, randomised trial. <i>Lancet Neurol.</i> 2009 Apr;8(4):326–33 (4)	ECA	No se trataba de una RS
Li Y-P, Hou M-Z, Lu G-Y, Ciccone N, Wang X-D, Dong L, et al. Neurologic Functional Outcomes of Decompressive Hemicraniectomy Versus Conventional Treatment for Malignant Middle Cerebral Artery Infarction: A Systematic Review and Meta-Analysis. <i>World Neurosurg.</i> 2017 Mar;99:709–725.e3 (5)	RS	No posee desenlaces de interés. Baja calidad post evaluación AMSTAR II
Lu X, Huang B, Zheng J, Tao Y, Yu W, Tang L, et al. Decompressive craniectomy for the treatment of malignant infarction of the middle cerebral artery. <i>Sci Rep.</i> 2015 May 17;4(1):7070 (6)	RS	Baja calidad post evaluación AMSTAR II
Omay SB, Carrión-Grant GM, Kuzmik GA, Fu M, Grant R, Schindler JL, et al. Decompressive hemicraniectomy for ischemic stroke in the pediatric population. <i>Neurosurg Rev.</i> 2013 Jan 11;36(1):21–5 (7)	Revisión	No se trataba de una RS
Qureshi AI, Ishfaq MF, Rahman HA, Thomas AP. Hemicraniectomy versus Conservative Treatment in Large Hemispheric Ischemic Stroke Patients: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. <i>J Stroke Cerebrovasc Dis.</i> 2016 Sep;25(9):2209–14 (8)	RS	No posee desenlaces de interés. Baja calidad post evaluación AMSTAR II
Sahuquillo J, Arikan F. Decompressive craniectomy for the treatment of refractory high intracranial pressure in traumatic brain injury. <i>Cochrane Database Syst Rev.</i> 2006 Jan 25;(1):CD003983 (9)	RS	Publicado en el año 2006

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngua-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). *Acta Med Peru.* 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Estudios	Diseño	Razón por la cual se excluyó
Shah S, Murthy SB, Whitehead WE, Jea A, Nassif LM. Decompressive Hemicraniectomy in Pediatric Patients with Malignant Middle Cerebral Artery Infarction: Case Series and Review of the Literature. <i>World Neurosurg.</i> 2013 Jul;80(1–2):126–33 (10)	Serie de casos	No se trataba de una RS
van Middelaar T, Nederkoorn PJ, van der Worp HB, Stam J, Richard E. Quality of Life after Surgical Decompression for Space-Occupying Middle Cerebral Artery Infarction: Systematic Review. <i>Int J Stroke.</i> 2015 Feb 15;10(2):170–6 (11)	RS	No posee desenlaces de interés. Baja calidad post evaluación AMSTAR II
Yang M-H, Lin H-Y, Fu J, Roodrajeetsing G, Shi S-L, Xiao S-W. Decompressive hemicraniectomy in patients with malignant middle cerebral artery infarction: A systematic review and meta-analysis. <i>Surg.</i> 2015 Aug;13(4):230–40 (12)	RS	Baja calidad post evaluación AMSTAR II
Yao Z, Ma L, You C, He M. Decompressive Craniectomy for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A Systematic Review and Meta-analysis. <i>World Neurosurg.</i> 2018 Feb;110:121–8 (13)	RS	La población no fue pacientes con ACV isquémico, sino con ACV hemorrágico
Ye Z, Ai X, Hu X, Fang F, You C. Comparison of neuroendoscopic surgery and craniotomy for supratentorial hypertensive intracerebral hemorrhage. <i>Medicine (Baltimore).</i> 2017 Sep;96(35):e7876 (14)	RS	No posee desenlaces de interés
Zweckberger K, Juettler E, Bösel J, Unterberg WA. Surgical Aspects of Decompression Craniectomy in Malignant Stroke: Review. <i>Cerebrovasc Dis.</i> 2014;38(5):313–23 (15)	Revisión	No se trataba de una RS
Wang J-W, Li J-P, Song Y-L, Tan K, Wang Y, Li T, et al. Stereotactic Aspiration versus Craniotomy for Primary Intracerebral Hemorrhage: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. <i>Janigro D, editor. PLoS One.</i> 2014 Sep 19;9(9):e107614 (16)	RS	No posee desenlaces de interés

Listado de citas evaluadas a texto completo e **incluidas** para la pregunta PICO N° 8:

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaranga-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). *Acta Med Peru.* 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Estudios	Diseño
Alexander P, Heels-Ansdell D, Siemieniuk R, Bhatnagar N, Chang Y, Fei Y, et al. Hemicraniectomy versus medical treatment with large MCA infarct: a review and meta-analysis. <i>BMJ Open</i> . 2016 Nov 24; 6(11):e014390 (17)	RS

Pregunta 8: En pacientes con ACVi ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas y seguras para la rehabilitación del paciente con ataque cerebrovascular isquémico de origen arterial durante los primeros 15 días posteriores al inicio de los síntomas?

Resumen de la búsqueda por cada pregunta PICO:

Esta pregunta clínica tuvo 5 preguntas PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Nº	Pregunta PICO (criterios de elegibilidad de los estudios)	Tipo de estudio	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citas identificadas en cada base de datos	Número de citas evaluadas a texto completo/ Número de estudios incluidos
8.1	P: Pacientes con ACV I/C: uso sistemático de SNG / uso restrictivo O: Desenlaces priorizados	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 369 • CENTRAL: 74 Citaciones después de excluir duplicados: 411	1/1
8.2	P: Pacientes con ACV I/C: complementos nutricionales / no uso O: Desenlaces priorizados	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 369 • CENTRAL: 74 Citaciones después de excluir duplicados: 411	1/1
8.3	P: Pacientes con ACV I/C: terapia lenguaje y habla / no uso O: Desenlaces priorizados	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 369 • CENTRAL: 74 Citaciones después de excluir duplicados: 411	2/1

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngua-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). *Acta Med Peru*. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

8.4	<p>P: Pacientes con ACV</p> <p>I/C: manejo de la disfagia/ no uso</p> <p>O: Desenlaces priorizados</p>	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 369 • CENTRAL: 74 <p>Citaciones después de excluir duplicados: 411</p>	4/1
8.5	<p>P: Pacientes con ACV</p> <p>I/C: inicio de la rehabilitación/ no uso</p> <p>O: Desenlaces priorizados</p>	RS de ECA	Enero 2014 a marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> • MEDLINE: 369 • CENTRAL: 74 <p>Citaciones después de excluir duplicados: 411</p>	2/2

Estrategias de las búsquedas realizadas y listado de las citas evaluadas:

Estrategia de búsqueda para la pregunta **Pregunta 8:**

Base de datos: Medline		
Fecha de búsqueda: marzo 2018		
Filtros:		
<ul style="list-style-type: none"> • Publication dates: From: 2010/01/01 • RS 		
	Descripción	Término
#1	Población	Search (((((((stroke[MeSH Terms]) OR acute strokes[MeSH Terms]) OR acute stroke[MeSH Terms]) OR Brain ischemia[MeSH Major Topic])) NOT (((((((rodent[MeSH Terms]) OR animal model[MeSH Terms]) OR animal models[MeSH Terms]) OR animal model[Title/Abstract]) OR animal models[Title/Abstract]) OR neonatal[Title/Abstract]) OR newborn[Title/Abstract]) OR infant[Title/Abstract])))
#2	Intervención	((((((Rehabilitation[MeSH Terms]) OR Motor Activity[MeSH Terms]) OR Aphasia[MeSH Terms]) OR dysphagia[MeSH Terms]) OR nutritional support[MeSH Terms]) OR physical therapy specialty[MeSH Terms]) OR Send to: Physical Therapy Modalities[MeSH Terms]) OR Speech Therapy[MeSH Terms]) OR Early Ambulation[MeSH Terms]) AND Therapeutics[MeSH Terms]
#3	Tipo de estudio	((systematic review[Publication Type]) OR (meta-analysis[Publication Type]))

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngua-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, *et al.* Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

#4	Desenlace	<ul style="list-style-type: none"> • Mortalidad • Discapacidad según escala modificada de Rankin • Efectos adversos
#5	Término final	#1 AND #2 AND #3

Listado de citas evaluadas a texto completo y **excluidas** para la pregunta 8:

Estudios	Diseño	Pregunta PICO N°	Razón por la cual se excluyó
Gomes F, Hookway C, Weekes CE. Royal college of physicians intercollegiate stroke working party evidence-based guidelines for the nutritional support of patients who have had a stroke. <i>Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association.</i> 2014;27:107-121	Guía clínica	8.2	
Stephens M. The effectiveness of speech and language therapy for poststroke aphasia. <i>Am J Nurs.</i> 2017;117:19	Review	8.3	Resumen de recomendaciones Cochrane
Liao X, Xing G, Guo Z, Jin Y, Tang Q, He B, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation as an alternative therapy for dysphagia after stroke: A systematic review and meta-analysis. <i>Clinical rehabilitation.</i> 2017;31:289-298	RS	8.4	Terapia no considerada como prioritaria
Chen YW, Chang KH, Chen HC, Liang WM, Wang YH, Lin YN. The effects of surface neuromuscular electrical stimulation on post-stroke dysphagia: A systemic review and meta-analysis. <i>Clinical rehabilitation.</i> 2016;30:24-35	RS	8.4	Terapia no considerada como prioritaria
Yang SN, Pyun SB, Kim HJ, Ahn HS, Rhyu BJ. Effectiveness of non-invasive brain stimulation in dysphagia subsequent to stroke: A systemic review and meta-analysis. <i>Dysphagia.</i> 2015;30:383-391	RS	8.4	Terapia no considerada como prioritaria

Listado de citas evaluadas a texto completo e **incluidas** para la pregunta 8:

Estudios	Diseño	Pregunta PICO N°
The FOOD Trial Collaboration. Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke patients (food): A	ECA	8.1

Citar como: Sequeiros-Chirinos JM, Alva-Díaz CA, Pacheco-Barríos K, Huaríngá-Marcelo J, Huamaní-Saldaña Ch, Camarena-Flores CE, et al. Diagnóstico y tratamiento de la etapa aguda del accidente cerebrovascular isquémico: Guía de práctica clínica del Seguro Social del Perú (EsSalud). *Acta Med Peru.* 2020;37(1):54-73. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2020.371.869>

Estudios	Diseño	Pregunta PICO N°
multicentre randomised controlled trial. <i>The Lancet</i> . 2005;365:764-772		
Kelly H, Brady MC, Enderby P. Speech and language therapy for aphasia following stroke. <i>The Cochrane database of systematic reviews</i> . 2010:Cd000425	RS	8.3
Geeganage C, Beavan J, Ellender S, Bath PM. Interventions for dysphagia and nutritional support in acute and subacute stroke. <i>The Cochrane database of systematic reviews</i> . 2012;10:Cd000323	RS	8.2 y 8.4
Lynch E, Hillier S, Cadilhac D. When should physical rehabilitation commence after stroke: A systematic review. <i>International journal of stroke : official journal of the International Stroke Society</i> . 2014;9:468-478	RS	8.5
Li Z, Zhang X, Wang K, Wen J. Effects of early mobilization after acute stroke: A meta-analysis of randomized control trials. <i>Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association</i> . 2018;27:1326-1337	RS	8.5