DOI 10.25176/RFMH.v21i4.3987

ARTÍCULO ORIGINAL

# CORRELACIÓN ENTRE MORTALIDAD POR COVID-19, ÍNDICES DE RIQUEZA Y DESARROLLO HUMANO Y DENSIDAD POBLACIONAL EN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA DURANTE EL 2020

CORRELATION BETWEEN MORTALITY DUE TO COVID-19, WEALTH INDEX, HUMAN DEVELOPMENT AND POPULATION DENSITY IN DISTRICTS OF METROPOLITAN LIMA DURING 2020

Zalia E. Dorregaray-Farge<sup>1,a</sup>, Alonso Soto<sup>2,3,b</sup>, Jhony De la Cruz Vargas<sup>2,b</sup>

#### RESUMEN

Ojetivos: Determinar la correlación entre la mortalidad por COVID-19 y el porcentaje de pobreza e Índice de desarrollo Humano (IDH) distrital en el departamento de Lima. Métodos: Estudio observacional ecológico de correlación. La población fueron pacientes fallecidos por COVID-19 en Lima metropolitana. Se incluyeron a todos los pacientes fallecidos reportados en la base de datos abiertos del Ministerio de Salud. La variable dependiente fue la mortalidad por COVID-19 calculada dividiendo el número de muertes entre la población total de los distritos y las variables independientes fueron el porcentaje de pobreza e IDH. Se realizó un análisis secundario evaluando la letalidad por COVID-19. La correlación se calculó mediante el método no paramétrico de Spearman. Resultados: 13154 personas fallecieron por COVID-19 durante el periodo de marzo a setiembre, la mayoría fue del sexo masculino con un promedio de edad de 66 años. No se encontró una correlación significativa entre mortalidad y porcentaje de pobreza (rho=-0,2230; p=0,15). Se encontró una correlación significativa entre mortalidad por COVID-19 e IDH (rho=0,4466; p=0,002). La mortalidad se correlacionó con la densidad poblacional (rho=0,7616; p=<0,001). Se encontró una correlación positiva (rho=0,32) y significativa (p=0,037) entre la letalidad y el porcentaje de pobreza. Se encontró una correlación significativa entre letalidad por COVID-19 y densidad poblacional (rho=0,7616; p=<0,001). No se encontró correlación significativa entre letalidad y el IDH. Conclusión: La densidad poblacional fue el factor asociado de manera más consistente a mortalidad y letalidad por COVID. La pobreza se asoció a mayor letalidad, pero no a mayor mortalidad.

Palabras clave: Infección por Coronavirus; Mortalidad; Pobreza; Índice de desarrollo humano (fuente: DeCS BIREME).

#### **ABSTRACT**

Objectives: To determine the correlation between mortality from COVID-19 and the percentage of poverty and the district Human Development Index (HDI) in the department of Lima. Methods: Ecological observational correlation study. The population were patients who died from COVID-19 in metropolitan Lima. All deceased patients reported in the open database of the Ministry of Health were included. The dependent variable was the mortality from COVID-19 calculated by dividing the number of deaths by the total population of the districts and the independent variables were the percentage of poverty and HDI. A secondary analysis was performed evaluating the fatality from COVID-19. The correlation was calculated using Spearman's non-parametric method. Results: 13,154 people died from COVID-19 during the period from March to September, the majority were male with an average age of 66 years. No significant correlation was found between mortality and percentage of poverty (rho = -0.2230; p = 0.15). A significant correlation was found between mortality from COVID-19 and IDH (rho = 0.4466; p = 0.002). Mortality was correlated with population density (rho = 0.7616; p = <0.001). A positive (rho = 0.32) and significant (p = 0.037) correlation was found between fatality and the percentage of poverty. A significant correlation was found between COVID-19 fatality and population density (rho = 0.7616; p = <0.001). No significant correlation was found between lethality and the HDI. **Conclusions:** Population density was the factor most consistently associated with mortality and fatality from COVID. Poverty was associated with higher fatality, but not higher mortality.

Key words: Coronavirus infection; Mortality; Poverty; Human development index (source: MeSH NLM).

Citar como: Zalia E. Dorregaray-Farge, Alonso Soto, Jhony De la Cruz Vargas. Correlación entre mortalidad por COVID-19, índices de riqueza y desarrollo humano y densidad poblacional en distritos de Lima Metropolitana durante el 2020. Rev. Fac. Med. Hum. Octubre 2021; 21(4): 780-789. DOI 10.25176/RFMH.v21i4.3987

Journal home page: http://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH

Artículo publicado por la Revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Es un artículo de acceso abierto, distribuído bajo los términos de la Licencia Creative Commons: Creative Commons Attribution 4.0 International, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada. Para uso comercial, por favor póngase en contacto con revista.medicina@urp.pe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Facultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Instituto de investigaciones en Ciencias biomédicas. Facultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departamento de Medicina. Hospital Nacional Hipólito Unanue.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Médico Cirujano.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Médico Internista . MSc, PhD

### INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID-19 inicio a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan en China<sup>(1)</sup>. Esta enfermedad tiene una clínica variada que va desde una infección asintomática, enfermedad leve del tracto respiratorio superior hasta una neumonía viral grave con insuficiencia respiratoria<sup>(2,3)</sup>. Existen sin embargo pocas investigaciones que evalúen la correlación entre aspectos sociodemográficos y económicos de las poblaciones con la mortalidad por COVID-19.

En estudios internacionales se hace referencia que las muertes por COVID-19 son comparables e incluso superiores al total de muertes por opioides y VIH/SIDA<sup>(4)</sup>. En Estados Unidos, La desigualdad de ingresos monetarios se ve reflejada en mayor número de muertes y ello puede generar las diferencias encontradas en los diferentes estados<sup>(5)</sup>. Otros estudios que han evaluado el efecto de los indicadores sociodemográficos en comunidades rurales y urbanas, han encontrado asociación entre el estado socioeconómico (riesgos relativos [RR] de 1,42 y 1,71) y dominios de vivienda y transporte (RR 1,52 y 1,32) con un mayor riesgo de diagnóstico de COVID-19 y muerte<sup>(6)</sup>. Otra consecuencia reportada de las inequidades tiene relación con la disponibilidad de pruebas de diagnóstico para toda la población. Al inicio de la pandemia había más diagnósticos en los sitios más desfavorecidos y con el trascurrir del tiempo esto cambio, empezó a reportarse un mayor número de casos positivos en sitios con mayor riqueza. Las inequidades asociadas a factores raciales también han tenido un papel. Por ejemplo, se reporta el doble de riesgo de hospitalización por COVID-19 en la población afroamericana en Estados Unidos<sup>(7)</sup>.

Un estudio peruano analizó la mortalidad por causas no violentas y quintiles distritales, mostrando una relación entre el índice de desarrollo humano (IDH) y mortalidad por COVID-19, siendo mayor el número de muertes por COVID-19 en quintiles con menor IDH. Aunque en este estudio no se encontró una asociación significativa entre pobreza y mortalidad, sus hallazgos se encuentran limitados por el poco tiempo de observación<sup>(8)</sup>.

Nuestro estudio busca determinar la correlación entre mortalidad por COVID-19, porcentaje de pobreza, IDH y densidad poblacional de los distritos de Lima Metropolitana durante el 2020.

## **MÉTODOS**

#### Diseño y área de estudio

Estudio observacional, ecológico tipo correlacional; realizado a partir de datos de Lima Metropolitana.

#### Población y Muestra

La población de este estudio estuvo conformada por todos los pacientes fallecidos por COVID-19 en los distritos de Lima Metropolitana, para el desarrollo de esta investigación se usó la base de datos de acceso libre del Ministerio de Salud del Perú disponible en el siguiente link : https://www.datosabiertos.gob. pe/dataset/fallecidos-por-covid-19-ministerio-desalud-minsa/resource/4b7636f3-5f0c-4404-8526.

#### Variables e instrumentos

La variable principal fue mortalidad por COVID-19 y también como factores potenciales que pueden influir en las tasas de infección y muerte. Estos factores podrían agruparse en cuatro categorías principales: Características de la población, factores ambientales/geográficos, política sanitaria y factores relacionados con el virus.

Para el desarrollo de esta investigación se usó la base de datos de acceso libre del Ministerio de Salud del Perú<sup>(4,9)</sup>. Las estadísticas de IDH y de porcentaje de pobreza distrital fueron obtenidos a partir del informe: "Herramienta de lucha contra la pobreza-Módulo Perú<sup>(9)</sup>. La densidad demográfica de los distritos de Lima se obtuvo del informe titulado: "Provincia de Lima: Compendio estadístico-2017". Este documento forma parte del último censo poblacional y de vivienda desarrollado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el 2017(10).

#### **Procedimientos**

Una vez que se obtuvo la base de datos consolidada por distritos. El análisis descriptivo se realizó en función del tipo de variable.

#### **Análisis Estadístico**

El análisis descriptivo se realizó en función del tipo de variable. Para las variables cuantitativas se usó medidas de tendencia central y dispersión en función de la normalidad de los datos. Para las variables cualitativas se usó frecuencias y porcentajes.



La correlación entre la mortalidad por COVID-19, porcentaje de pobreza y densidad poblacional se calculó utilizando el método de correlación de Spearman. Se consideró significativo un valor de p<0,05. El análisis estadístico se realizó utilizando el Paquete Estadístico Stata V15<sup>(11)</sup>. A la par se realizó un análisis multivariado (regresión robusta).

#### **Aspectos Éticos**

La presente investigación utiliza la información de una base de datos de acceso libre. La codificación de los pacientes hace imposible descubrir los datos personales de los pacientes fallecidos por COVID-19. El estudio contó con la aprobación del comité de ética institucional de la Universidad Ricardo Palma.

#### **RESULTADOS**

Se analizó los datos de 13 154 personas fallecidas por COVID-19 en Lima desde el 18 de marzo hasta el 30 de setiembre del 2020. El 70,9% (9325) del total de fallecidos fue del sexo masculino. El promedio de edad fue de 66,00 años con una desviación estándar de 14,01. Los distritos con mayor número de fallecidos fueron San Juan de Lurigancho con un 11,4% (1 499), Lima con 8,3% (1096) y San Martin de Porres con 7,0% (919). Los distritos con menor número de fallecidos fueron los distritos de Punta Hermosa (9 fallecidos), San Bartolo (9 fallecidos), Punta Negra (2 fallecidos), Santa María del Mar (1 fallecido). Los distritos con mayor letalidad por COVID-19 fueron Villa El Salvador (6,04%), La Victoria (5,12%), Chorrillos (5,07%) y San Juan de Lurigancho (4,99%). Los distritos con menor letalidad por COVID-19 fueron Santa María del Mar (1,54%), Jesús María (1,72%) y Punta Negra (2,0%). El total de fallecidos por distritos se muestra en la tabla 1. La mortalidad y letalidad por COVID-19 en el mismo periodo se muestra en la tabla 2.

La tabla 3 muestra el porcentaje de Pobreza y el índice de desarrollo humano de cada distrito de Lima durante el 2020. El índice de pobreza de los distritos varió desde 0,2% en el distrito de Miraflores, San Isidro hasta 41,1% en el distrito de Pachacamac y 40,7% en Puente Piedra. Con relación al IDH distrital se aprecia que San Isidro y Miraflores cuentan con los mejores índices con 0,809 y 0,790 respectivamente;

los distritos con menor IDH fueron los distritos de Puente Piedra (0,673) y Pachacamac (0,669). La tabla 3 muestra la densidad poblacional de los distritos de Lima según el último censo realizado por el INEI. Se aprecia que los distritos de Punta Negra y Punta Hermosa presentan la menor densidad poblacional con 64 y 67 Hab/Km2, respectivamente; mientras que los distritos de Surquillo y Breña presentan los mayores niveles de densidad poblacional con 2 6438 y 2 3202 Hab/Km2.

# Mortalidad por COVID-19 y su correlación con pobreza, IDH y densidad poblacional

No se encontró una correlación significativa entre mortalidad y porcentaje de pobreza (rho= -0,2230; p=0,150) (Figura1). Se encontró una correlación significativa entre mortalidad por COVID-19 e IDH (rho= 0,4466; p=0,002) (Figura 1). Se encontró una correlación significativa entre mortalidad por COVID-19 y densidad poblacional (rho=0,7616; p=<0,001) (Figura 1).


# Letalidad por COVID-19 y su correlación con pobreza, IDH y densidad poblacional

Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre letalidad por COVID-19 y porcentaje distrital de pobreza (rho=0,319; p=0,037) (Figura 1). Se encontró una correlación no significativa entre letalidad por COVID-19 e IDH distrital (rho=-0,106; p=0,501) (figura 1). Se encontró una correlación significativa entre letalidad por COVID-19 y densidad poblacional (rho=0,7616; p=<0,001) (Figura 1).

Adicionalmente, se encontró una correlación significativa entre porcentaje de pobreza e IDH distrital (rho= -0,8871; p<0,001) (Figura 1).

En el modelo de regresión robusta utilizado, sólo la densidad poblacional fue un factor asociado con la mortalidad por COVID-19 (Coeficiente beta:0,06 IC95%:0,03-0,08; p<0,001). La densidad poblacional también se asoció a letalidad por COVID-19 (Coeficiente beta: 0.06 IC95%:0,03-0,08; p<0,001). Los resultados se muestran en la tabla 4, por lo tanto, se asume que la regresión robusta asocia mucho más la densidad poblacional con la mortalidad y letalidad, siendo pobreza e IDH, variables no significativas.

(**%**)



**Gráfico 1.** Diagrama de dispersión: mortalidad por Covid-19 y porcentaje de pobreza distrital. B: Diagrama de dispersión: mortalidad por COVID-19 e índice de desarrollo humano distrital. C: Diagrama de dispersión: mortalidad por COVID-19 y densidad poblacional distrital. D: Diagrama de dispersión: letalidad por COVID-19 y porcentaje de pobreza distrital. E: Diagrama de dispersión: letalidad por COVID-19 e Índice de Desarrollo Humano. F: Diagrama de dispersión: letalidad por COVID-19 y densidad poblacional distrital. G: Diagrama de dispersión: índice de desarrollo humano y porcentaje de pobreza distrital.

 Tabla 1. Frecuencia de fallecidos por COVID-19, Lima 2020.

	Fallec	idos por covid-19
Distrito	Frecuencia	%
San Juan de Lurigancho	1499	11,4
Lima	1096	8,3
San Martin de Porres	919	7,0
Villa el Salvador	848	6,4
Comas	841	6,4
Ate	740	5,6
San Juan de Miraflores	569	4,3
La Victoria	556	4,2
Villa Maria del Triunfo	533	4,1
Chorrillos	480	3,6
El Agustino	428	3,3
Los Olivos	413	
Santa Anita		3,1
	392	3,0
Santiago de Surco	364	2,8
Rimac	362	2,8
Independencia	332	2,5
Puente Piedra	298	2,3
Carabayllo	293	2,2
Breña	233	1,8
Jesus Maria	229	1,7
Lurigancho	168	1,3
San Miguel	168	1,3
Surquillo	162	1,2
Pueblo Libre	139	1,1
Lince	133	1,0
La Molina	124	,9
Miraflores	113	,9
Lurin	97	,7
San Borja	93	,7
San Luis	93	,7
Magdalena del Mar	80	,6
Pachacamac	67	,5
Barranco	63	,5
Ancon	56	,4
Chaclacayo	52	,4
San isidro	49	,4
Pucusana	22	,2
Cieneguilla	18	,1
Santa Rosa	11	,1
Punta Hermosa	9	,1
San Bartolo	9	,1
Punta Negra	2	,0
Santa Maria del Mar	1	,0
Total	13154	100,0

 Tabla 2. Mortalidad y Letalidad por COVID-19 en Lima ,2020.

Distrito	Población	Casos	Muertes	Mortalidad (x 1000hab)	Letalidad(%)
Villa El Salvador	423887	12326	848	2,00	6,04
La Victoria	188619	9499	556	2,95	5,12
Chorrillos	355978	8390	480	1,35	5,07
San Juan de Lurigancho	1177755	26351	1499	1,27	4,99
Villa María del Triunfo	437992	9562	533	1,22	4,96
Breña	93111	3708	233	2,50	4,91
Santa Anita	221776	7093	392	1,77	4,86
Pueblo Libre	94010	2300	139	1,48	4,78
San Bartolo	8722	172	9	1,03	4,65
Comas	573884	15888	841	1,47	4,61
San Juan de Miraflores	412865	10740	569	1,38	4,57
Barranco	35915	1148	63	1,75	4,44
Ate	670818	14305	740	1,10	4,38
Lurín	109506	1924	97	0,89	4,37
Rímac	180260	7530	362	2,01	4,26
San Martín de Porres	744050	18260	919	1,24	4,23
Lima	267379	23359	1096	4,10	4,11
Lince	59578	2507	133	2,23	4,11
Independencia	222850	7175	332	1,49	4,06
Ancón	82677	1140	56	0,68	4,04
Pucusana	16615	503	22	1,32	3,98
Pachacámac	142133	1417	67	0,47	3,95
Surquillo	100339	3429	162	1,61	3,85
Carabayllo	400414	6596	293	0,73	3,79
Punta Hermosa	22230	159	9	0,40	3,77
El Agustino	221974	10043	428	1,93	3,69
Lurigancho	283231	3949	168	0,59	3,65
Los Olivos	351983	9671	413	1,17	3,64
Santiago de Surco	408086	8231	364	0,89	3,61
Magdalena del Mar	65139	1855	80	1,23	3,56
Puente Piedra	395819	7517	298	0,75	3,53
La Molina	160244	3060	124	0,77	3,14
Cieneguilla	39055	421	18	0,46	3,09
Chaclacayo	44157	1450	52	1,18	3,03
San Miguel	173309	4384	168	0,97	3,03
San Luis	55793	2242	93	1,67	2,99
Miraflores	108855	3170	113	1,04	2,81
Santa Rosa	37940	331	11	0,29	2,72
San Borja	127102	3447	93	0,73	2,29
San Isidro	67703	2129	49	0,72	2,11
Punta Negra	8243	100	2	0,24	2,00
Jesús María	81743	11381	229	2,80	1,72
Santa María del Mar	1142	65	1	0,88	1,54



**Tabla 3.** Porcentaje de pobreza e índice de desarrollo distrital de Lima, 2020 y densidad poblacional distrital durante el último censo de Lima.

Distrito	Pobreza (%)	Índice de Desarro- llo Humano (IDH)	Distrito	Densidad pobla- cional (Hab/Km2)
Pachacámac	41,10	,669	Punta Negra	64.00
Puente Piedra	40,70	,673	Punta Hermosa	67.00
Lurín	37,70	,678	Ancón	139.00
Villa El Salvador	37,40	,690	Santa María del Mar	173.00
Pucusana	37,10	,692	San Bartolo	179.00
Carabayllo	35,40	,687	Cieneguilla	207.00
Cieneguilla	35,20	,675	Pucusana	481.00
Independencia	33,10	,699	Lurín	496.00
El Agustino	32,60	,690	Pachacámac	855.00
Villa María del Triunfo	32,10	,691	Carabayllo	917.00
Ancón	32,00	,676	Santa Rosa	921.00
San Juan de Miraflores	30,90	,693	Lurigancho	970.00
Punta Negra	30,50	,682	Chaclacayo	1119.00
San Juan de Lurigancho	30,40	,685	La Molina	2734.00
San Bartolo	28,80	,695	San Isidro	4816.00
Ate	28,40	,695	Puente Piedra	5241.00
Comas	27,80	,699	Villa María del Triunfo	6600.00
Punta Hermosa	26,30	,684	Miraflores	8484.00
Santa Rosa	24,50	,683	Ate	8515.00
Lurigancho	23,80	,682	Chorrillos	8630.00
Santa Anita	23,60	,693	San Juan de Lurigancho	8674.00
Rímac	20,60	,714	Barranco	8700.00
San Martín de Porres	18,90	,709	Santiago de Surco	10290.00
Santa María del Mar	17,50	,680	Comas	11021.00
La Victoria	15,80	,731	San Borja	11316.00
Lima	15,50	,727	Lima	12088.00
Chorrillos	3,40	,702	San Miguel	12803.00
Chaclacayo	2,80	,702	Villa El Salvador	13594.00
Los Olivos	2,10	,706	Rímac	13723.00
San Luis	1,20	,719	Independencia	15135.00
Surquillo	,70	,736	Magdalena del Mar	15215.00
Pueblo Libre	,70	,740	El Agustino	15574.00
Breña	,70	,736	Jesús María	15685.00
La Molina	,60	,736	Lince	16193.00
Barranco	,60	,742	San Luis	16751.00
Santiago de Surco	,50	,755	San Juan de Miraflores	17342.00
San Miguel	,50	,753	Pueblo Libre	17381.00
Magdalena del Mar	,50	,758	La Victoria	19068.00
San Borja	,40	,766	San Martín de Porres	19777.00
Lince	,40	,752	Los Olivos 21080.00	
Jesús María	,30	,769	Santa Anita 22291.00	
San Isidro	,20	,809	Breña	23202.00
Miraflores	,20	,790	Surquillo	26438.00

**Tabla 4.** Factores asociados a mortalidad y letalidad por covid-19 a nivel distrital.

Mortalidad por COVID-19	Coeficiente beta	Valor de p	IC 95%
Porcentaje de pobreza	0,03	0,07	-0,015;0,021
Índice de desarrollo Humano	0,46	0,90	-7,35;8,27
Densidad poblacional	0,06	<0,001	0,03;0,08
Letalidad por COVID-19	Coeficiente beta	Valor de p	IC 95%
Porcentaje de pobreza	0,2	0,205	-0,01;0,06
Índice de desarrollo Humano	-6,56	0,370	-7,35;8,27
Densidad poblacional	0,06	0,003	0,02;0,10

#### **DISCUSIÓN**

Los resultados de este estudio muestran que la mortalidad por COVID-19 en los distritos de Lima fue elevada en su mayoría adultos mayores de 60 años y del sexo masculino. Además de esto se logró determinar que, desde los inicios de la pandemia, hasta el mes de setiembre existió una correlación positiva (a nivel distrital) entre la letalidad por el COVID-19 y el nivel de pobreza a nivel distrital, La densidad poblacional fue el factor asociado de manera más consistente a mortalidad y letalidad por COVID-19. Por cada aumento de la densidad poblacional (en mil habitantes), la letalidad y mortalidad de la infección por COVID-19 distrital aumentaría en un 6%. La pobreza se asoció a mayor letalidad, pero no a mayor mortalidad.

Las muertes por COVID-19 son en su mayoría personas adultas mayores de sexo masculino con presencia de comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad, diabetes(31-34). Estudios previos como los de Hernández-Vásquez et al.<sup>(8)</sup> describen un exceso de mortalidad de 20093 muertes no violentas y 2979 muertes confirmadas por COVID-19 en el departamento de Lima metropolitana durante las primeras 24 semanas del año 2020, en donde las personas adultas mayores, varones y en situación de pobreza son quienes más han fallecido por esta enfermedad(8).

Los resultados principales de este estudio muestran que a mayor pobreza distrital mayor letalidad por COVID-19. Esto se asemeja a investigaciones previas como las de Ogedegbe et al., Gadson et al. y Hernández-Vásquez et al. (8) entre otros (14,15). Ogedegbe et al. muestra en su estudio la existencia de una variación sustancial de la letalidad por

COVID-19 en los distritos de la ciudad de Nueva York determinando que zonas con la mayor cantidad de personas que viven en la pobreza y los niveles más bajos de logro educativo tuvieron las tasas más altas de muerte relacionadas con COVID-19(9). De la misma manera Hernández-Vásquez et al. describe que el exceso de muertes por COVID-19 fue mayor en los distritos con pobreza extrema<sup>(8)</sup>. El estudio de estas relaciones muestra la importancia de la disponibilidad de recursos monetarios distritales frente a la letalidad de esta pandemia ya que distritos con menor disponibilidad de recursos económicos tienen mayor probabilidad de contar con menores recursos de infraestructura y recursos humanos presentando a su vez un mayor número de muertes (14,15)

Este estudio ha evaluado la correlación a nivel distrital de la letalidad con el porcentaje de pobreza. Si bien este estudio evaluó una población menor a comparación de otros estudios como Achoki et al. que evalúan países que demuestran una situación similar<sup>(16-18)</sup>. Achoki et al. demostró que la letalidad por COVID-19 (al inicio de la pandemia) fue mayor en países más empobrecidos en continentes como África y que esto también se podría replicar en países de América Latina, tal y como podemos observar mediante los resultados de esta investigación (18,19).

La principal implicancia de esta investigación viene a ser la posibilidad de determinar grupos poblacionales con mayor riesgo frente a los cuales el estado y el ministerio de salud pueda intervenir y focalizar acciones de prevención como detección temprana de casos, de pacientes con mayor riesgo de infección y mortalidad, así como la referencia temprana a establecimientos de salud de mayor complejidad, particularmente en aquello distritos



con mayores niveles de pobreza.

Las principales limitaciones de esta investigación están relacionadas con la calidad de la base de datos. Es probable la existencia de un subregistro de los pacientes fallecidos al inicio de la pandemia por motivos de falta de conocimiento de otros criterios diagnósticos y demora en la respuesta de resultados de pruebas moleculares entre otros. Al ser un estudio ecológico, los resultados deben de interpretarse a nivel distrital y no necesariamente a nivel individual. Sin embargo, consideramos que el riesgo de falacia ecológica es poco probable.

### **CONCLUSIÓN**

El COVID-19 se trasmite de persona a persona directamente, siendo causante de muchas complicaciones como desencadenante de neumonía, la trasmisión se da entre personas que guarden muy

Contribuciones de autoría: Los autores participaron en la génesis de la idea, diseño de proyecto, recolección e interpretación de datos, análisis de resultados y preparación del manuscrito del presente trabajo de investigación.

Financiamiento: Autofinanciado.

Correspondencia: Zalia Elizabeth Dorregaray Farge.

Dirección: Av. Alfredo Benavides 5440, Santiago de Surco, Lima, Perú.

**Teléfono:** +51 999986642

Correo: zalia.dorregaray@urp.edu.pe

poca distancia entre sí, esta enfermedad viajará por las gotitas respiratorias, esta enfermedad se propagaran al toser la persona infectada, es por eso la importancia de la asociación entre mortalidad como letalidad a la densidad poblacional, ya que al haber contacto entre personas la propagación seria mayor, en los resultados de regresión robusta se demuestra esto, que al aumentar la densidad poblacional en mil habitantes la letalidad por COVID-19 distrital aumentaría en 6%, también se puede observan que los distritos con, menor densidad poblacional tuvieron menos muertes en un análisis bivariado, y se llega a asociar mucho más en una regresión robusta, así se demuestra que la densidad poblacional es un factor muy relevante, dejando de tener asociación la pobreza y el IDH.

Es muy importante la prevención de aglomeración de personas en lugares cerrados o de poca ventilación, ya que esto haría la propagación mucho más fácil.

**Conflicto de interés:** Los autores declaran no tener conflicto de interés.

Recibido: 08 de junio 2021

Aprobado: 05 de agosto 2021



#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chan JWM, Ng CK, Chan YH, Mok TYW, Lee S, Chu SYY, et al. Short term outcome and risk factors for adverse clinical outcomes in adults with severe acute respiratory syndrome (SARS). Thorax. 2003;58(8):686–9. DOI: 10.1136/thorax.58.8.686
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020;395(10223):497–506. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5
- Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020;395(10223):507–13. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7
- Goldstein JR, Lee RD. Demographic perspectives on the mortality of COVID-19 and other epidemics. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(36):22035–41. DOI: 10.1073/pnas.2006392117
- 5. Oronce CIA, Scannell CA, Kawachi I, Tsugawa Y. Association Between State-Level Income Inequality and COVID-19 Cases and Mortality in the USA. Journal of general internal medicine. 2020; 35:2791–3. DOI: 10.1007/s11606-020-05971-3
- Khazanchi R, Beiter ER, Gondi S, Beckman AL, Bilinski A, Ganguli I. County-Level Association of Social Vulnerability with COVID-19 Cases and Deaths in the USA. Journal of general internal medicine. 2020; 35:2784–7. DOI: 10.1007/s11606-020-05882-3
- Price-Haywood EG, Burton J, Fort D, Seoane L. Hospitalization and Mortality among Black Patients and White Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2020;382(26):2534–43. DOI: 10.1056/NEJMsa2011686
- Hernández-Vásquez A, Gamboa-Unsihuay JE, Vargas-Fernández R, Azañedo D. [Excess mortality in Metropolitan Lima during the COVID-19 pandemic: A district level comparison]. Medwave. 2020;20(8):e8031. DOI: 10.5867/medwave.2020.08.8032
- Ogedegbe G, Ravenell J, Adhikari S, Butler M, Cook T, Francois F, et al. Assessment of Racial/Ethnic Disparities in Hospitalization and Mortality in Patients With COVID-19 in New York City. JAMA Netw open. 2020;3(12):e2026881. DOI: DOI: 10.1001/ jamanetworkopen.2020.26881.
- 10. INEI. Provincia de Lima: Compendio estadístico-2017. 2017. Disponible en https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\_digitales/Est/Lib1477/libro.pdf. Fecha de acceso 8/04/2021.

- 11. StataCorp. 2017. Stata Statistical Software: Release 15. College Station, TX: StataCorp.LLC
- 12. Gadson A, Akpovi E, Mehta PK. Exploring the social determinants of racial/ethnic disparities in prenatal care utilization and maternal outcome. Semin Perinatol [Internet]. 2017;1–10. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1053/j.semperi.2017.04.008
- Abedi, V., Olulana, O., Avula, V. et al. Racial, Economic, and Health Inequality and COVID-19 Infection in the United States. J. Racial and Ethnic Health Disparities (2020). DOI: 10.1007/s40615-020-00833-4
- Porcheddu R, Serra C, Kelvin D, Kelvin N, Rubino S. Similarity in Case Fatality Rates (CFR) of COVID-19/SARS-COV-2 in Italy and China. J Infect Dev Ctries. 2020;14(2):125–8. DOI: 10.3855/jidc.12600
- 15. Acosta LD. [Response capacity to the COVID-19 pandemic in Latin America and the Caribbean]. Rev Panam Salud Publica. 2020;44:e109. DOI: 10.26633/RPSP.2020.109
- 16. Andrades-Grassi JE, Cuesta-Herrera L, Bianchi-Pérez G, Grassi HC, López-Hernández JY, Torres-Mantilla H. Análisis espacial de riesgo de morbilidad y mortalidad por COVID-19 en Europa y el Mediterráneo en el año 2020. Cuad Geográficos. 60(1):279–94. DOI: 10.30827/cuadgeo. v60i1.15492
- 17. Ponce P, Loaiza V, del Río M de la C, Parra LB. Efecto de la desigualdad y la actividad económica en el COVID-19 en Ecuador: un bosquejo de sus posibles determinantes económicos, sociales y demográficos. Contaduría y Adm. 2020;65(4):211. DOI:10.22201/fca.24488410e.2020.3044.
- Achoki T, Alam U, Were L, Gebremedhin T, Senkubuge F, Lesego A, et al. COVID-19 pandemic in the African continent: forecasts of cumulative cases, new infections, and mortality. medRxiv. 2020. Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.09.20059154v3
- Schmidt A, Sfeir D, Schlosser H. Correlación entre características psicosociodemográficas con la tasa de mortalidad y letalidad por COVID-19 según región en Chile. Rev ANACEM. 2019;13(1): 10–20. Disponible en: correlation-between-psycho-socio-demographicvariables-and-cov\_FyKO8Qx.pdf (bvsalud.org)



